

EPI	INDICAÇÃO PARA USO	REUTILIZAÇÃO	TEMPO DE TROCA	ACONDICIONAMENTO	DESINFECÇÃO/DESCARTE
CAPOTE/AVENTAL	Utilizado pelos profissionais de saúde para evitar a contaminação da sua pele e/ou roupa durante a assistência ao paciente com COVID-19.	Não deve ser reutilizado	Após a realização de procedimentos no paciente	Após o uso deverá ser descartado	Descartável
GORRO	Utilizado pelos profissionais de saúde para proteger os seus cabelos e cabeça nos procedimentos que podem gerar aerossóis.	Não deve ser reutilizado	Após a realização de procedimentos no paciente	Após o uso deverá ser descartado	Descartável
LUVAS	Utilizado por profissionais de saúde durante a realização de procedimentos ao paciente suspeito/confirmado da COVID-19 e/ou contato com os materiais ao seu entorno	Não deve ser reutilizada	Após a realização de procedimentos no paciente	Após o uso deverá ser descartada	Descartável
MASCARA CIRÚRGICA	Utilizada por pacientes com sintomas de infecção respiratória, profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestem assistência a menos de 1 metro do paciente suspeito/confirmado da COVID-19.	Não deve ser reutilizada	Quando estiver úmida ou suja	Após o uso contínuo deverá ser descartada	Descartável
MASCARA N95	Utilizada por profissionais de saúde ao realizar procedimentos geradores de aerossóis. Ex: Intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica, ressuscitação cardiopulmonar, coleta de amostras nasotraqueais, etc.	O nº de reutilizações da máscara, pelo mesmo profissional, deve considerar as rotinas orientadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)	Quando estiver úmida, suja, rasgada, amassada ou com vinco. Pode ser reutilizada por 07 dias ou de acordo com protocolo da CCIH da instituição.	Pode ser utilizado saco/envelope de papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. Os elásticos da máscara deverão ser acondicionados para fora da embalagem	Descartável
PROTETOR FACIAL/ÓCULOS	Utilizados por profissionais de saúde ao realizar procedimentos com risco de exposição a respingos de sangue, secreções corporais, excreções, etc	É reutilizável	Após a realização de procedimentos no paciente	Podem ser armazenados em embalagens plásticas, em um local seguro e sem risco de choque	Deve ser lavado com água e sabão/detergente; Desinfetado com álcool líquido a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante ou pela CCIH

FONTE: Nota Técnica nº 04 Anvisa atualizada em 31/03/2020